

# OS TOXOS GALEGOS

por Henrique Niño Ricoi

**Baixo a denominación *toxo* coñécense aquelas plantas do xénero botánico *Ulex* que definen ás formacións vexetais comunmente chamadas *toxeiras* que, xunto a *xesteiras*, *queirugais* e *uceiras*, conforman a paisaxe galega por antonomasia. Todas estas formacións están moi adaptadas ó clima oceánico e ós solos pobres en nutrientes tan característicos de Galicia.**

Raramente tamén se chama **toxo** a algúna especie do xénero *Genista* (por exemplo *Genista anglica* = **toxo bravo**), facilmente distinguibles dos auténticos **toxos** por ter follas verdadeiras cando adultas, cousa que, como se verá máis adiante, non ocorre no xénero do que se ocupa este traballo.

O nome latino *Ulex* procede do grego *Ulé* = maleza, broza ou do latino *Uligo* = pantano, marisma en alusión ós seus hábitats más característicos.

O xénero *Ulex* pertence á familia das LEGUMINOSAS ou PAPILONÁCEAS e as especies que o comprenden caracterízanse principalmente por ser arbustos sempre verdes, formados exclusivamente por espiñas, se ben despois da xerminación, as primeiras follas que aparecen teñen o limbo plano con tres folíolos (coma o trevo), mais nas follas seguintes o limbo aborta, transformándose os pecíolos en espiñas simples e afiadas.

As flores deste xénero teñen a corola tipicamente papilonácea, de cor amarela e o cáliz, tamén amarelo, cos sépalos reunidos entre eles de maneira que non forman en apariencia más que dous lóbulos ou labios, o superior con dous dentes e o inferior con tres. Baixo este dispónense dúas pequenas brácteas (bractéolas) que xunto ó cáliz son moi útiles para determinar as distintas especies do xénero.

Dentro da corola atópanse os estames (10) que están soldados entre si polos filamentos.

O froito é un legume máis ou menos inchado que iguala ou case non supera ó cáliz.

En Galicia pódense atopar ata seis toxos diferentes comprendidos en catro especies, dúas delas con dúas subespecies cada unha. Estes son:

*Ulex europaeus L. subsp. europaeus*

*Ulex europaeus L. subsp. latebracteatus (Mariz) Rothm.*

*Ulex gallii Planchon*

*Ulex micranthus Lange*

*Ulex minor Roth subsp. minor*

*Ulex minor Roth subsp. breoganii Castroviejo e Valdés-Bermejo*

Para distinguirmos uns doutros, podemos recorrer a esta pequena chave

\*Bractéolas de máis de 2 mm. de ancho. Cáliz con pelos dispersos

=Bractéolas ovadas de 2-4 mm.....

*Ulex europaeus subsp. europaeus*

=Bractéolas arredondadas de 4-7 mm.....

*Ulex europaeus subsp. latebracteatus*

\*Bractéolas de menos de 2 mm. de ancho. Cáliz con pelos esmagados ou sen pelos

=Cáliz de menos de 6,5 mm.....

*Ulex micranthus*

= Cáliz de 7-11 mm. Corola superando ó cáliz en menos de 2 mm.

• Cáliz de 7-9 mm.....

*Ulex minor subsp. minor*

• Cáliz de 9-11 mm.....

*Ulex minor subsp. breoganii*

= Cáliz de 11-14 mm. Corola superando ó cáliz en máis de 2 mm.....

*Ulex gallii*

***Ulex europaeus L.*****Toxo, toxo arnal**

Arbusto que pode chegar ata os 2,5 m. de altura, erecto, verde cincento, todo cuberto de espiñas, formando unha mata robusta e densa, verde todo o ano. A medida que medra vai perdendo as ramas da parte inferior quedando o tronco nu. Espiñas de 15-30 mm. asucadas, robustas e dereitas.

Flores con cáliz de 12-20 mm. de pelos patentes e corola amarela viva de 15-30 mm. Bractéolas de 2-4 mm. e forma ovada na subespecie europaeus ou más anchas (4-7 mm., de aí seu nome) e arredondadas na subespecie latebracteatus.

Legume oval, mouro, moi piloso, de 11-20 mm. que conserva restos da corola seca.

Esta especie florece en primavera e verán, inda que tamén pode facelo no outono, atopándose por toda Galicia.



ULEX EUROPAEUS L.

***Ulex minor Roth***

*Ulex nanus T.F.Foster ex Symons*

**Toxo gateño, toxo molar**


Arbusto espiñento de ata 1 m. de altura, dun verde brillante, con moitos caules, a miúdo tombados.

Espiñas de 8-15 mm. lisas, febles e delgadas.

Flores con cáliz de 7-11 mm., pubescente con pelos aplicados e corola de 8-12 mm. amarela pálida a miúdo estriada de vermello. Bractéolas de 0,5 mm. de ancho.

Legume oval-romboidal, mouro, de non máis de 8 mm., piloso.

Florece de xuño a novembro, atopándose a subespecie minor no sur de Galicia e a subespecie breoganii (dedicada ó caudillo celta Breogán) por todo o territorio galego excepto no norte.



ULEX MINOR ROTH

***Ulex gallii Planchon* (dedicada ó botánico Le Gall)**

*Ulex opistholepis Webb.*

**Toxo femia**

Arbusto espiñento moi semellante ó toxo gateño, verde case que glauco, con ramas inclinadas e a miúdo curvadas cara abaixo con espiñas lixeiramente asucadas e fortes.

Flores con cáliz de 11-14 mm., pubescente con pelos aplicados e corola de cor amarela-laranxa de 13-17 mm. Bractéolas de 0,75 mm.

Legume oblongo, mouro e piloso de non máis de 5 mm.

Florece en agosto e setembro, podéndose atopar no norte de Galicia.

***Ulex micranthus Lange* (do grego mikrós = pequeno e anthos = flor)**

*Ulex lusitanicus Mariz*

**Toxo portugués**

Arbusto espiñento que non pasa dos 0,8 m. (é o más pequeno dos nosos toxos) con ramas arqueadas e espiñas de 7-12 mm. grosas e fortes.

Flores con cáliz pubescente de 5-6,5 mm. e corola amarela de 6,5-9 mm.

Legume oval-romboidal primeiro pilosa, despois glabra de non máis de 4 mm.

Florece de marzo a agosto atopándose no sur de Galicia.

ULEX GALLII PLANCHON

## PEQUENO GLOSARIO BOTÁNICO

**aplicado:** arrimado, que se aproxima ó órgano que o sustenta ata xuntarse con el.

**arbusto:** vexetal leñoso de non máis de 5 m. sen un tronco preponderante, polo que se ramifica desde a base.

**bráctea:** folla transformada, situada nas proximidades da flor de forma, cor, tamaño e consistencia variables.

**bractéola:** pequena bráctea

**corola papilonácea:** corola formada por cinco pétalos: un grande e superior (estandarte), dous laterais (asas) e dous inferiores más ou menos soldados entre si que forman a quilla.

**endemismo:** propio exclusivamente de determinado país, rexión, etc.

**erecto:** dise do caule que desde o comenzo do seu desenvolvemento está en posición vertical ou próxima a ela.

**folíolo:** cada unha das partes nas que se divide unha folla composta.

**glaucio:** verde-mar, de cor verde clara con matiz ligeiramente azulado.

**glabra:** desprovista de pelos.

**hábitat:** lugar onde vive unha especie ou comunidade, neste caso é más preciso falar de biótopo.

**legume:** froito seco que se abre por dúas suturas (ventral e dorsal). Sinónimo de **vaíña**.

**limbo:** lámina da folla.

**lóbulo:** división dun órgano, principalmente follas, cálices ou corolas.

**oblongo:** más longo que ancho, coas beiras converxentes.

**ovado:** en forma de ovo coa parte más ancha no ápice.

**oval:** en forma de óvalo. Sinónimo de **ovalado**. Non confundir con ovado.

**patente:** aberto, estendido, que forma un ángulo moi aberto co órgano que o sustenta.

**pecíolo:** rabo que une a base da folla ó caule.

**pubescente:** cuberto de pelos finos e suaves ó tacto.

## BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

**BONNIER, Gaston**

*Flore complète illustrée en couleurs de France, Suisse et Belgique.*

PARIS

**FONT QUER, Pío**

*Diccionario de botánica*

Ed. Labor. BARCELONA 1.985

**GARCÍA, Xosé Ramón**

*Guía das plantas con flores de Galicia*

Ed. Galaxia. VIGO. 1.991

**KREBLE MARTIN, W.**

*The new concise british flora*

Mermaid Books. LONDON 1.986

**MERINO, Baltasar**

*Flora descriptiva e ilustrada de Galicia*

SANTIAGO 1905

